

Patienten-Information **Darmspiegelung = Koloskopie**

Was ist zu beachten?

- Vorgespräch erforderlich. Sei erhalten hierzu in der Regel einen festen Termin.
- Überweisungsschein, Versichertenkarte, Medikamentenplan und ggf. Diagnosenliste zum Vorgespräch mitbringen.
- Bei Cumarin-Patienten (z.B. Marcumar®) ist ein INR-Wert <1,8 erforderlich, andere Gerinnungshemmer (z.B. Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®, Lixiana®) 24 h vorher weglassen. Acetylsalicylsäure (Herz ASS®, Aspirin®) kann i.d.R. weiter genommen werden.
- Patienten, bei denen eine Umstellung der Blutgerinnung (sog. Bridging) erforderlich ist, sollten beim Hausarzt entsprechend umgestellt werden. Dort wird festgelegt, ob sog. niedermolekulares Heparin (NMH) überbrückend gegeben werden muss (z.B. Fraxiparin®, Clexane®, MonoEmbolex® o.ä.).
- NMH darf am Untersuchungstag nicht gegeben werden. Die Anwendung wird beim Aufklärungsgespräch festgelegt.
- Patienten mit durchlebter Endocarditis oder mechanischem Herzklappenersatz sollten zum Schutz der Klappen ggf. Endokarditisprophylaxe lt. aktueller Leitlinie erhalten.
- Beim Vorgespräch informieren wir Sie über notwendiges Essverhalten, Zubereitung und Einnahme der Darmreinigungs-lösungen für die Untersuchung. Die Reinigungslösung bzw. ein entsprechendes Rezept erhalten Sie bei uns in der Praxis.
- Bitte achten Sie auf bequeme Kleidung, nach Möglichkeit kurz arm, und lassen Sie Ihren Schmuck (auch Ohrringe u. Piercings) zu Hause.
- **Achtung!** Nach der Untersuchung mit sedierender Prämedikation (leichter Betäubung) darf 24 Stunden lang keine aktive Teilnahme am Straßenverkehr erfolgen. Sie dürfen auch nicht an laufenden Maschinen mit Verletzungsgefahr arbeiten.
- Lassen Sie sich bitte nach der Untersuchung in der Praxis abholen.
- Aufklärungsbogen (Patiententeil) ist dem Patienten im Original auszuhändigen, der Unterschriftenteil wird kopiert. Kopie an Patient.

Bei Fragen: Gemeinschaftspraxis Innere Medizin Fulda
Adalbertstr. 1 - 36039 Fulda - Telefon: 0661/2001 - info@innere-medizin-fulda.de